

Blødning ved samleje (kontaktblødning) og pletblødning

Ved blødning ved samleje og pletblødning er det nødvendigt at foretage en udvidet undersøgelse af slimhinden i livmoderhalsen for at udelukke celleforandringer.

Undersøgelsen omfatter:

- Almindelig gynækologisk undersøgelse
- Kolposkopi (kikkertundersøgelse af livmodermunden)
- Ultralydsundersøgelse af livmoder og æggestokke
- Slimhindeprøve fra livmoderhalskanalen,
- Vævsprøve fra livmodermunden (biopsi)
- Dyrkning for bakterier (inkl. klamydia)

Før vi tager prøver, vil du blive informeret om formålet med prøven samt den lille risiko der er forbundet hermed og du skal give mundtlig accept.

Du tilbydes en let lokalbedøvelse af livmoderhalsen, denne er dog sjældent nødvendigt.

Undersøgelsen varer 10-15 min. Derefter er du klar til at tage hjem eller på arbejde igen og må gerne køre bil.

Undersøgelsen går som regel let og uden større ubehag. Let blødning fra skeden er almindelig efter undersøgelsen og kan varer op til 1 uge men skal være aftagende.

Vævsprøverne sendes til mikroskopisk undersøgelse på Hvidovre Hospital. Du får svar på prøven efter ca. 2 uger. Alle vil få svar. Hvis prøven er helt normal for du svar på SMS, ellers du blive kontaktet på telefonen. Hvis du mod forventning ikke har hørt fra os inden for 2 uger, er du velkommen til at kontakte klinikken.

For at undgå infektion og øget blødning skal du undgå samleje, tamponer, karbad og svømning til blødningen er ophørt. Ved blødning over normal menstruationsstyrke, øget mængde udflåd, smerter eller feber, skal du kontakte klinikken, eller vagtlæge 1813.